

BRONQUIOLITIS

U التهاب الشعب الهوائية

ما هو التهاب الشعب الهوائية؟

هي إصابة فيروسية يتعرض لها الأطفال الذين عمرهم دون الثانية سنة و تظهر عبر صعوبات التنفس المحدثة لزفير يسمع من الصدر. عادة ما تبدأ الظاهرة بسعال و مخاط عبر الأنف متبوعة بعد 3 أو 4 أيام بصعوبة في التنفس، و يكون فيها الطفل جد منفعل بدون شهية و فيه حمى.

ما الواجب عمله في المنزل؟

- إن غسيل أن الطفل بواسطة مصل فيزيولوجي ضروري إذا كان أنفه مملوءا بالمخاط من الأحسن قيل تناول الأكل.
- لتفادي إعياء الطفل وجبات الطفل يجب أن تكون صغيرة و لكن متكررة.
- تجنبوا المحيط المملوء بالدخان.

متى يجب التوجه إلى مصلحة الاستعجالات؟

- إذا كانت حالته الصحية العامة متدهورة، كثير الانفعال أو يميل بكثرة للنوم.
- إذا ظهر عياء الطفل أثناء الرضاعة أو الأكل، و كانت وجبته ضعيفة أو لم يتناولها.
- إذا كان لونه شاحب
- إذا تدهورت طريقة تنفسه بسرعة و تلاحظ ضلوعه يحرك بكثرة بطنه، و يدخل صدره أو يتوقف عن التنفس لبض الثواني.

هام جدا

- حاليا لا يوجد أي علاج لالتهاب الشعب الهوائية.
- تدوم الأعراض من 2 إلى 4 أسابيع.
- بعض الأطفال بعدما عانوا من التهاب الشعب الهوائية، يتعرضون بتكرار الصعوبات في التنفس مع سعال.